• 210 x 180 mm • Corps : 8 pt (9 pt Times New Roman) • Interligne : 9 pt (> 3mm) • Intermot : > 2 mm
• Spot : 1,5 x 8 mm à 64,2 mm du bord droit • **EN ACCORD AVEC LA NOUVELLE GUIDELINE 2011**

Parfois votre médecin peut être amené à prescrire une posologie supérieure: **0.50mg/kg/prise: DEUX DOSES CORRESPONDANT AU POIDS DE L'ENFANT PAR PRISE.** Dans ce cas, il est nécessaire de répéter l'opération décrite ci-dessus une deuxième fois pour chaque prise.

L'usage de la seringue pour administration orale est strictement réservé à l'administration de cette suspension de dompéridone chez l'enfant et le nourrisson de moins de 12 ans.

La seringue pour administration orale doit être démontée, rincée et séchée après chaque utilisation.

Durée de traitement

La durée initiale du traitement est de 4 semaines. Si les symptômes persistent après 4 semaines, consultez votre médecin qui évaluera la nécessité de poursuivre le traitement. Dans tous les cas, respecter strictement la prescription de votre médecin.

Si vous avez pris plus de PERIDYS que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PERIDYS : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par PERIDYS est arrêté : sans objet.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PERIDYS est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Très rares : réaction allergique, effets secondaires extrapyramidaux (modification de la tonicité des muscles et de la régulation des mouvements involontaires et automatiques), urticaire.
- Rares : augmentation des taux de prolactine (hormone qui provoque la lactation), galactorrhée (écoulement de lait en dehors des périodes d'allaitement), gynécomastie (développement anormal des seins chez l'homme), aménorrhée (troubles des règles), troubles gastro-intestinaux, y compris des crampes intestinales très rares et passagères.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER PERIDYS

Pas de précaution particulière de conversation. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Suspension buvable : Après ouverture, conserver le médicament pendant 3 mois maximum.

Date de révision de la notice : juillet 2003

Information médicale : 0 800 950 564

CYCLAMED

Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

716 815

Pierre Fabre

Péridys

Dompéridone

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire

PERIDYS 1mg/ml, suspension buvable

Substance active : dompéridone ..... 1.00 mg Pour 1 ml de suspension buvable

Les autres composants sont :

Polysorbate 20, solution d'hydroxyde de sodium, cellulose microcristalline et carmellose sodique, sorbitol à 70 pour cent (non cristallisable), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), saccharine sodique, arôme caramel-fruits rouges, eau purifiée.

PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé

Substance active : dompéridone ..... 10.00 mg.
Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants sont :

Noyau : povidone, amidon de riz, lactose monohydraté, cellulose excipient, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, huile de ricin hydrogénée. Pelliculage : hypromellose

Titulaire/Exploitant :

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel-Gance 92100 Boulogne

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 45, Place Abel-Gance 92100 Boulogne

1 - QU'EST-CE QUE PERIDYS ET DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable

Ce médicament se présente sous forme d'une suspension buvable en flacon de 200 ml avec seringue pour administration orale. Ce médicament contient du dompéridone, substance appartenant à la famille des antagonistes de la dopamine. Il agit sur la motricité intestinale. Chez l'adulte, il est indiqué dans le soulagement des nausées et vomissements, sensations de ballonnements, gênes ou régurgitations gastriques (remontées du contenu de l'estomac dans la bouche) Chez l'enfant, il est indiqué dans le soulagement des nausées et vomissements.

•716815•NoticePFDpéridys.indd 1 29/10/10 13:54

PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 40. Ce médicament contient du dompéridone, substance appartenant à la famille des antagonistes de la dopamine. Il agit sur la motricité intestinale. Chez l'adulte et l'adolescent (plus de 12 ans et plus de 35 kg), il est indiqué dans le soulagement des nausées et vomissements, sensations de ballonnements, gênes ou régurgitations gastriques (remontées du contenu de l'estomac dans la bouche).

2 - INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE PERIDYS

PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

Allergie connue au dompéridone ou à l'un des autres composants de ce médicament. Tumeur hypophysaire à prolactine (prolactinome). Saignements de l'estomac ou de l'intestin, obstruction mécanique ou perforation digestive.

PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

Allergie connue au dompéridone ou à l'un des autres composants de ce médicament. Prolactinome (maladie de la glande hypophysaire). Saignements de l'estomac ou de l'intestin, obstruction mécanique ou perforation digestive. En cas d'occlusion intestinale, en raison de la présence d'huile de ricin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prendre des précautions particulières avec PERIDYS

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance hépatique (défaillance des fonctions du foie). Ce médicament sera utilisé AVEC PRECAUTION en cas d'insuffisance rénale (défaillance des fonctions du rein). En cas de traitement prolongé, votre médecin sera amené à vous suivre régulièrement.

PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable : en raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire) Ce médicament contient 0.18 mg de sodium par ml de suspension buvable : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.

PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé : en raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou du déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Grossesse - Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si ce médicament vous est prescrit au cours de la grossesse, respectez la posologie et la durée du traitement établies par votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. L'utilisation de ce médicament au cours de l'allaitement est déconseillée. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n'altère pas (ou de façon négligeable) la capacité à conduire ou à utiliser des machines.

Liste des excipients à effet notoire

PERIDYS suspension buvable : sorbitol, sodium

PERIDYS comprimé : lactose, huile de ricin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3 - COMMENT PRENDRE PERIDYS

Posologie :

PERIDYS 1mg/ml, suspension buvable : la posologie usuelle est de 0.25 à 0.50 mg/kg/prise, 3 à 4 prises par jour (sans dépasser 80 mg / jour). DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ STRICTEMENT L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN. Si vous avez l'impression que l'effet de PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable, est trop fort ou trop faible : consultez votre médecin ou votre pharmacien.

PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé

Adultes et adolescents (plus de 12 ans et plus de 35 kg)

1 à 2 comprimés 3 à 4 fois par jour, sans dépasser 8 comprimés par jour. La forme comprimé n'est pas adaptée aux enfants pesant moins de 35 kg. Les enfants seront traités préférentiellement avec une forme suspension buvable.

Mode d'administration

Voie orale. Il est recommandé de prendre ce médicament avant les repas. Si le médicament est pris après les repas, son absorption est quelque peu retardée.

PERIDYS 1mg/ml, suspension buvable

Adultes et adolescents (plus de 12 ans et plus de 35 kg) : 2 à 4 cuillerées à café, 3 à 4 fois par jour.

Nourrissons et enfants : Ce médicament s'administre au moyen de la seringue pour administration orale fournie (graduée en kg de poids corporel) qui permet de mesurer la quantité de suspension pour 1 prise.

Mode d'emploi de la seringue pour administration orale

Par exemple, si votre médecin prescrit 0.25 mg/kg/prise: UNE DOSE CORRESPONDANT AU POIDS DE L'ENFANT PAR PRISE : la dose à administrer est obtenue en aspirant la suspension en tirant le piston de la seringue pour administration orale jusqu'à la graduation correspondant au poids de l'enfant : enfants jusqu'à 20 kg : remplir la seringue jusqu'à la graduation correspondant au poids de l'enfant.

Enfants de plus de 20 kg : remplir une première fois la seringue jusqu'à la graduation 20 kg, puis une deuxième fois jusqu'à atteindre la graduation permettant d'atteindre un total égal au poids de l'enfant. Par exemple, pour un enfant de 35 kg : remplir une première fois la seringue jusqu'à la graduation 20 kg puis une deuxième fois jusqu'à la graduation 15 kg.